

ID	<<SYPID>>	患者氏名	<<ORIBP_KANJI>> 様	口蓋形成術受けられる方へ【患者用クリニカルパス(入院スケジュール)】			
年月日	2022年9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	
経過	入院	術前	術後	手術1日後	手術2日後	手術3日後	退院
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 入院の必要性が理解できる 手術の概要や入院中のスケジュールが理解できる 	<ul style="list-style-type: none"> 発熱や咳等がなく手術を受けることができる 	<ul style="list-style-type: none"> 発熱がない 創部に問題ない 安静が守られている 痛みが調整できている 	<ul style="list-style-type: none"> 発熱がない 創部に問題ない 安静が守られている 痛みが調整できている 	→		<ul style="list-style-type: none"> 発熱がない 創部に問題がない 水分・食事が摂取できている 退院後の生活について理解ができる
検査治療処置	<ul style="list-style-type: none"> 形成外科医師による診察 麻酔科医による診察 身長・体重測定実施 	<ul style="list-style-type: none"> ネームバンド装着確認 手術衣に更衣しパンツまたはオムツ着用 体温、脈拍、血圧を測定 	<ul style="list-style-type: none"> 心電図モニター・SpO2モニターを付けます 手術後必要に応じて酸素吸入します 痛みに応じて痛み止めを使用します 栄養チューブが鼻に入っています 帰宅後・3時間後・6時間後・12時間後吸入をします 	<ul style="list-style-type: none"> 痛みに応じて痛み止めを使用します 	→		<ul style="list-style-type: none"> 形成外科外来にて創部の観察を行います その後退院が決定します 
内服薬注射	<ul style="list-style-type: none"> 2週間以内に風邪症状があればお伝えください 現在飲んでいる薬があれば、医師、看護師、薬剤師のいずれかにお伝えください(継続または中止になります) 	<ul style="list-style-type: none"> 手術室にて点滴挿入します 抗生剤を投与します 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴は挿入したまま帰室します 	<ul style="list-style-type: none"> 抗生剤投与します 医師の指示あるまで点滴は継続します 	→		<ul style="list-style-type: none"> 医師の指示のもと状態に応じて点滴を抜針します。
活動安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内安静度フリー 	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内安静度フリー 	<ul style="list-style-type: none"> 抱っこ可 	→			<ul style="list-style-type: none"> 病棟内安静度フリー
食事	<ul style="list-style-type: none"> 離乳食・幼児食・ミルク 麻酔科の指示により絶飲食の時間を説明します 	<ul style="list-style-type: none"> 絶飲・絶食の指示があります 指示を必ず守ってください 	<ul style="list-style-type: none"> 医師指示あれば、麻酔から覚醒後数時間で栄養チューブからミルク、口蓋裂用の哺乳瓶あれば水分(水・お茶のみ)開始する 	<ul style="list-style-type: none"> 栄養チューブからミルク、口蓋裂用の哺乳瓶あれば水分(水・お茶のみ)開始する 	<ul style="list-style-type: none"> 栄養チューブの抜去 コップでのお茶・ミルク摂取可 ゼリーやヨーグルトも摂取可 	<ul style="list-style-type: none"> 離乳食前期を開始 哺乳瓶でミルク摂取可 	<ul style="list-style-type: none"> 手術4日目～柔らかいうどんやそうめん摂取可 手術5日目～離乳食中期まで摂取可 手術後3～4週間ほどで術前の食事にしていく予定です(適宜外来で医師から説明あり)
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴 		<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴禁止 	<ul style="list-style-type: none"> 全身清拭 	<ul style="list-style-type: none"> 全身清拭 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴
排泄	<ul style="list-style-type: none"> オムツ交換 	<ul style="list-style-type: none"> オムツ交換 	<ul style="list-style-type: none"> 膀胱留置カテーテルを挿入したまま帰室します 	<ul style="list-style-type: none"> 状態に応じて膀胱留置カテーテル抜去します オムツ交換 	<ul style="list-style-type: none"> オムツ交換 	<ul style="list-style-type: none"> オムツ交換 	<ul style="list-style-type: none"> 【退院基準】 発熱がない 創部に異常がない 水分・食事が摂取できている 【退院後の治療計画】 創部の状態を退院して1週間後外来で診察します 【指導】 退院後の生活指導 【退院後の生活について】 退院後もストローは使用しないでください 医師の指示があるまで抑制筒は使用してください 手術後2週間は登園を控えてください
指導説明書類	<ul style="list-style-type: none"> 医師より入院説明 ネームバンド装着 診察券預かり 入院オリエンテーション 手術前オリエンテーション 集学オリエンテーション 手術同意書・麻酔同意書・身体抑制の同意書(医師から説明を受けた後サイン・捺印し、説明書とともに早めに看護師に渡してください) 病衣使用許可 抑制筒をが看護師に渡してください 	<ul style="list-style-type: none"> 11時30分に集学病棟でのオリエンテーション 	<ul style="list-style-type: none"> 気道閉塞症状に注意して経過を診るため、術後集学治療病棟に入ることがあります 手術後医師より、病状説明があります 両肘に抑制筒を装着します 気道閉塞予防のためステロイド吸入を行うことがあります 	<ul style="list-style-type: none"> 両肘に抑制筒を装着 	<ul style="list-style-type: none"> 両肘に抑制筒を装着 ストローは使用禁止 下顎の歯磨き可 (口蓋正中部の縫っている所に当たらないよう注意してください) 		<ul style="list-style-type: none"> 【連絡先】 徳島大学病院:088-631-3111 代表番号になっていますので、退院後は下記にお知らせください 形成科外来:088-633-7047 時間外受付:088-633-9211
リハビリ・その他							