

ID		患者氏名	様
----	--	------	---

アブレーション治療を受けられる方へ【金曜入院】 【患者用クリニカルパス(入院スケジュール)】

この計画書は診療の概要を記したものであり、状況に応じて変更することがあります。 ※何かご不明な点があったら、担当医又は看護師にお尋ねください。

年月日	年 月 日	月 日 ~ 月 日	月 日		月 日	月 日	月 日
経過	入院日	入院2日目～治療前日	治療当日		治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目(治療後3日目に退院)
			治療前	治療後			
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 身体に問題がなく採血等の検査が終了している。 検査の必要性について理解できる。 	<ul style="list-style-type: none"> 身体に問題がない。 治療前日の処置について理解できる。 治療の必要性について理解できる。 	<ul style="list-style-type: none"> 発熱なく治療を受けることができる。 	<ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している。 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない。 針を刺した所に異常がない。 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない。 指先の動きがスムーズである。 	<ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している。 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない。 針を刺した所に異常がない。 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない。 指先の動きがスムーズである。 	<ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している。 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない。 針を刺した所に異常がない。 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない。 指先の動きがスムーズである。 	<ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している。 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない。 針を刺した所に異常がない。 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない。 指先の動きがスムーズである。
検査治療処置	<ul style="list-style-type: none"> 体温、血圧、脈拍を測ります。 採血、心電図、胸部レントゲンなどの検査をします。 医師の診察があります。 心電図モニターを装着します。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、血圧、脈拍を測ります。 	<ul style="list-style-type: none"> 検査着に着替えます。 入れ歯、指輪、時計等は、はずします。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師の指示に沿って圧迫止血の圧迫を緩めていき、最終的には除去します。 必要時、採血、レントゲン検査、心電図検査があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 必要時、採血、レントゲン検査、心電図検査があります。 医師の診察があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 必要時、採血、レントゲン検査、心電図検査があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 必要時、採血、レントゲン検査、心電図検査があります。
内服薬注射	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤師・看護師が持参されたお薬を確認します。 内服薬は継続服用です。 	<ul style="list-style-type: none"> 内服薬は継続服用です。 	<ul style="list-style-type: none"> 指示した内服薬のみを服用してください。 持続点滴を開始します。 	<ul style="list-style-type: none"> 内服薬の服用を再開します。 指示された点滴量が終了したら点滴を抜去します。 			
活動安静度	<ul style="list-style-type: none"> 安静度に制限はありません。 		<ul style="list-style-type: none"> ストレッチャーで検査室に行きます。 	<ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師の指示で安静解が解除になります。 安静度に制限はありません。 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 治療食を食べます。 		<ul style="list-style-type: none"> 指示した時間以降の食事、飲水は禁止です。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後より飲水可能です。 治療後、3時間後から食事再開となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療食を食べます。 		
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴ができます。 		<ul style="list-style-type: none"> 治療まではシャワー浴ができません。 		<ul style="list-style-type: none"> 適宜、体を拭くお手伝いをします。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師の診察後、シャワー浴ができます。 	
排泄	<ul style="list-style-type: none"> トイレ歩行ができます。 		<ul style="list-style-type: none"> 治療まではトイレ歩行ができません。 尿の管をいれます。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後、ベッド上安静が解除されるまでは尿器、便器を使用します。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師の指示でトイレ歩行が可能となります。 		
指導説明書類	<ul style="list-style-type: none"> ネームバンドを装着します。 入院時オリエンテーションがあります。 医師から治療の説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療オリエンテーションと治療前、治療後の準備説明があります。 		<ul style="list-style-type: none"> 治療後、医師から説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院についての説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 【退院後の生活について】 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等の症状があるときは外来受診をしましょう。 針を刺した所に痛みがあったり、指先の色が悪かったり、冷たかったり、指先の動きが悪い時は外来受診をしましょう。 【連絡先】 退院後は下記にご連絡ください。 徳島大学病院:088-631-3111 内科外来:088-633-7118 時間外受付(救急外来):088-633-9211 	<ul style="list-style-type: none"> 【退院基準】 血圧が安定している。 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない。 針を刺した所に異常がない。 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない。 指先の動きがスムーズである。 【退院後の治療計画】 内服薬の継続 定期的な外来受診 【指導】 服薬指導 退院後の生活について指導
リハビリ・その他				<ul style="list-style-type: none"> 治療後、病棟に戻ります。 			